

Вакцина против эпидемического гриппа Тип b (Hib)

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ

1 Что такое эпидемический грипп?

Эпидемический грипп тип b (Hib) является тяжёлой болезнью, которую вызывает бактерия. Он обычно поражает детей до 5 лет.

Ваш ребёнок может заразиться этой инфекцией от окружающих детей или взрослых, которые могут быть носителями бактерий и не знать об этом. Бактерии передаются от человека к человеку. Если бактерии находятся у ребёнка в носу или в горле, то ребёнок, возможно, не заболеет. Но иногда бактерии попадают в легкие или в кровоток, и тогда инфекция может вызвать серьёзные осложнения.

До того, как была открыта вакцина, это заболевание являлось ведущей причиной бактериальных менингитов среди детей младше 5 лет в Соединённых Штатах.

Менингит - это инфекционное заболевание оболочек головного и спинного мозга, которое может привести к необратимым повреждениям головного мозга и глухоте. Инфекция может также

вызывать:

- пневмонию
- тяжёлый отёк горла, затрудняющий дыхание
- инфекцию крови, суставов, костей и оболочки сердца
- смерть.

До открытия вакцины около 20 000 детей в Соединённых Штатах в возрасте до 5 лет заболели тяжёлой формой эпидемического гриппа и около 1 000 человек умирали от этой болезни.

Hib вакцина против эпидемического гриппа может предохранить от этой болезни.

Большое количество детей получит эту инфекцию если мы прекратим вакцинацию.



2 Кто должен получить вакцину Hib против эпидемического гриппа и когда?

Дети должны получить вакцину Hib в возрасте:

- ✓ 2 месяца
- ✓ 4 месяца
- ✓ 6 месяцев*
- ✓ 12-15 месяцев

*В зависимости от типа вакцины, которая используется, Вашему ребёнку она может быть не показана в возрасте 6 месяцев. Врач или сестра скажет Вам, нужна ли эта прививка.

Если Вы пропустили прививку или получили её вне расписания, сделайте следующую прививку как можно скорее. Вам нет необходимости начинать всё сначала.

Противогриппозная вакцина Hib может быть дана вместе с другими вакцинами.

Старшие дети и взрослые

Дети старше 5 лет обычно не нуждаются в вакцине Hib. Но некоторые дети и взрослые при определённых условиях должны быть привиты. Эти условия включают серповидно-клеточную анемию, ВИЧ/СПИД, удалённую селезёнку, трансплантацию костного мозга или противоопухолевое лечение лекарствами. Обратитесь к врачу или медсестре за подробной информацией.

3 Некоторые люди не должны получать Hib вакцину или должны подождать

- Не должны получать Hib вакцину те, у кого наблюдалась угрожающая жизни аллергическая реакция на предшествующую прививку Hib вакцины.
- Дети в возрасте до 6 недель не должны получать Hib вакцину.
- Те, кто на время прививки, имеет умеренно выраженное или тяжёлое заболевание должны отсрочить прививку Hib вакцины до выздоровления.

Обратитесь к врачу или медсестре за более подробной информацией.

4**Какие осложнения от прививки Hib вакцины?**

Вакцина, как любое лекарство, способна вызвать серьезные осложнения, например, тяжелую аллергическую реакцию. Риск получить от Hib вакцины тяжелое повреждение или смерть очень мал.

Большинство людей, кто получает прививку Hib вакцины, не имеет никаких проблем.

Незначительно выраженные осложнения

- Покраснение, местное повышение температуры или припухлость в месте укола (1 случай из 4)
- Повышение температуры выше 101°F (1 случай из 20)

Эти явления обычно проявляются в день вакцинации. Они могут длиться в течение 2-3 дней.

**5****Что делать, если возникнет умеренно выраженная тяжелая реакция?****На что я должен(на) обратить внимание?**

Любое необычное состояние, такое как тяжелая аллергическая реакция, высокая температура или изменение в поведении. Признаки тяжелой аллергической реакции включают в себя нарушение дыхания, охриплость голоса или хрипы, крапивницу, бледность, слабость, учащенное сердцебиение или головокружение, появляющиеся от нескольких минут до нескольких часов после укола прививки.

Что я должен(на) делать?

- Звоните врачу или доставьте больного в больницу.
- Скажите врачу, что случилось, дату и время случившегося и когда была сделана прививка.
- Попросите врача, медсестру или отдел здравоохранения заполнить форму отчета по неблагоприятным реакциям на вакцину в информационную систему (VAERS) или позвоните туда сами по телефону 1-800-822-7967.

6**Национальная программа компенсации пострадавшим от иммунизации**

В тех редких случаях, когда Вы или Ваш ребенок получает серьезные реакции на вакцину, существует федеральная программа, помогающая оплатить расходы на лечение тем, кто пострадал.

Для более подробной информации о Национальной Программе компенсации пострадавшим от иммунизации звоните по телефону 1-800-338-2382 или посетите программу на Интернете <http://www.hrsa.gov/osp/vicpr/>

7**Как я могу узнать о прививках больше?**

- Обратитесь к врачу или медсестре. Она/он могут дать Вам инструкции по вакцинам или подсказать другие источники информации.
- Звоните в программу по иммунизации местного или штатского отдела здравоохранения.
- Обращайтесь в Центры по контролю и профилактики болезней (CDC):
 - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 - Посетите Национальную Программу по иммунизации на Интернете <http://www.cdc.gov/nip>



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С Ш А
 Центры по контролю и профилактике болезней
 Национальная Программа по иммунизации

Информация о вакцинах (на данный момент)
 Hib (12/16/98) - Russian 42 U.S.C. § 300aa-26